

カルハロース

作物別適用一覧表

作物名		施用時期	施用目的	散布回数
トマト		育苗期	健苗の育成、徒長防止	2～3回
		定植後～収穫期	葉先枯れ防止、尻腐れ防止、品質アップ	5～6回
いちご		定植後～収穫期	葉枯れ・チップバーン防止、軟質果防止、品質アップ、鮮度保持	5～7回
ぶどう		展葉後～果実肥大期	新葉緑部の葉焼け症防止、品質アップ	4～5回
桃		落花後～果実肥大期	実のしまり、鮮度保持、品質アップ	4～5回
メロン		育苗期	健苗育成、徒長防止	2～3回
		定植後～収穫期	肩こけ果、発酵果、変形果の防止、品質アップ	4～5回
りんご		落花後～果実肥大期	ビターピット防止	5～6回
ピーマン なす		育苗期	健苗育成、徒長防止	2～3回
		定植後～収穫期	尻腐れ、すじ果、がく割れ防止、品質アップ	4～5回
みかん		開花後～果実肥大期	新葉の黄化、浮き皮防止、品質アップ	4～5回
梅		展葉後～硬核期	果実の品質アップ	3～4回
柿		落花後～果実肥大期	実のしまり、鮮度保持、品質アップ	4～5回
白菜 玉ねぎ		生育期	芯腐れ、緑腐れ防止、品質アップ	4～5回
すいか		育苗期	健苗育成、徒長防止	2～3回
		定植後～収穫期	肩こけ果、発酵果、変形果の防止、品質アップ	4～5回
レタス、キャベツ 大根・かぶ		生育期	芯腐れ、葉緑の黄化防止、品質アップ	4～5回
花卉		生育期	カルシウム欠乏の予防	3～4回
その他の作物		生育期	カルシウム欠乏の予防	3～5回

早朝または夕方にしっかりと散布！

発売元：日本グリーンメンテナンス株式会社